

Godkända växtskyddsmedel.

PREPARAT REG NR KLASS VERKSAM SUBSTANS

GODKÄNDA HERBICIDER

Overtake	5634	2L	Fluroxipyr -1-metylheptylester 141,12 g/l; Florasulam 2,45 g/l
En applicering per år. OBS: endast vårbehandling. Dos vid nyetablering 0,75 l/ha, dos i etablerad gräsyta 1,8 l/ha. Godkänt t.o.m. 2028-02-15.			
Tomahawk 200 EC	5236	2L	Fluroxipyr -1-metylheptylester 288 g/l
Mot örtgräs på golfbanor. Max 1 applicering per år. Maxdos 1,8 l/ha. Godkänt t.o.m. 2028-02-15.			

TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

Credit Xtreme	5602	2L	Glyfosat (isopropylaminsalt 400,8g/l, kaliumsalt 297,7 g/l)
Mot ogräs och annan vegetation på vall, gräsbeklädd idrottsanläggningar, gräsmattor. Max 1 applicering per år. Maxdos 2,66 l/ha (1,44 kg glyfosat/ha). Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Godkänt t.o.m. 2028-04-30.			
Roundup Ultra XL	5974	2L	Glyfosat (kaliumsalt) 441 g/l
Verknings sätt: Systemiskt. Mot ogräs och annan vegetation. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Max 3 appliceringar/år. Maxdos per applicering: 4 l/ha. Total maxdos får inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong. Godkänt t.o.m. 2027-01-31.			

GODKÄNDA FUNGICIDER

Ascernity	6068	2L	Bensovindiflupyr 23,6 g/l; Difenokonazol 78,8 g/l
Mot svampsjukdomar, till exempel dollar spot, på tee och green. Max 2 appliceringar, minst 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 3 l/ha. OBS: se särskilda regler kring reducering av vindavdriften vid handhållen spruta i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Godkänt t.o.m. 2027-03-15. (OBS! Samma produkt med reg nr 5681 har utgått och får inte längre användas, lagras eller bortskaffas.)			
Exteris StressGard	5799	2L	Fluopyram 12,5 g/l; Trifloxystrobin 12,5 g/l
Verknings sätt: Systemiskt. Kan användas på tee, green och krage. Max 2 appliceringar/år, > 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 10 l/ha. Godkänt t.o.m. 2027-06-30. (OBS! Samma produkt med reg nr 5949 har utgått och får inte längre användas, lagras eller bortskaffas.)			
Heritage	5574	2L	Azoxystrobin 50 vikt-%
Verknings sätt: Systemiskt. Mot svampangrepp på tee och green på golfbanor. Max 2 appliceringar/år, minst 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 0,5 kg/ha. Godkänt t.o.m. 2028-05-31.			
Instrata Elite	6071	2L	Difenokonazol 80,3 g/l; Fludioxonil 80,3 g/l
Verknings sätt: Kontakt och systemiskt. Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. Godkänt t.o.m. 2026-06-15. (OBS! Samma produkt med reg nr 5466 har utgått och får inte längre användas, lagras eller bortskaffas.)			
Medallion TL	5075	2L	Fludioxonil 125 g/l
Verknings sätt: Kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. Max 4 appliceringar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Maxdos per applicering: 3 l/ha. Godkänt t.o.m. 2026-06-15.			
Signature Xtra Stressgard	5989	2L	Fosetylaluminium 60 vikt-%
Verknings sätt: Systemiskt. Mot snömögel och antraknos på tee och green på golfbanor. Max 3 appliceringar per år, minst 14 dagar mellan varje applicering. Maxdos 20 kg/ha. Godkänt t.o.m. 2027-10-31.			
Signum	4884	2L	Pyraklostrobin 6,7 vikt-%; Boskalid 26,7 vikt-%
Verknings sätt: Systemiskt. Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni–november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar. Godkänt t.o.m. 2026-09-15.			

GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

Attraxor	5549	2L	Prohexadionkalcium 10 vikt-%
För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Max 4 appliceringar/år, behandlingsintervall 21 dygn. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha. För rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök. Godkänt t.o.m. 2027-05-31.			
Primo Maxx II	6030	2L	Trinexapak (etylester) 116,39 g/l
För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Får användas mellan 1 mars och 30 nov, max 40 appliceringar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per applicering: 0,4 l/ha, totalt max 16 l per säsong. Rekommenderad dos och frekvens gäller för green. För tee, fairway och semiruff, se etikett. Godkänt t.o.m. 2040-04-30. (OBS! Samma produkt med reg nr 5410 har utgått och får inte användas, lagras eller bortskaffas efter 2026-11-30.)			

GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

Mycostop	4295	2L	Streptomyces griseoviridis stam K61 5,0E8 cfu/g
Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare off-label). Applicering vid temperatur över +15 grader C. Ärligen återkommande applicering endast på greenområden. Max 5 appliceringar per år, behandlingsintervall 21-28 dygn. Maxdos per applicering: 400 g/ha. Godkänt t.o.m. 2026-03-31.			
Prestop	4934	2L	Clonostachys rosea stam J1446 1E8 cfu/g46
Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare off-label). Applicering vid temperaturer mellan +5 och +15 grader C. Ärligen återkommande applicering endast på greenområden. Max 5 appliceringar per år, behandlingsintervall 21-28 dygn. Maxdos per applicering: 1 kg/ha. Godkänt t.o.m. 2035-03-31.			
Taegro	5935	2L	Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24 1E13 cfu/g
Verknings sätt: Systemiskt. Mot svampangrepp på green, tee och krage. Max 12 behandlingar per år, minst 3 dagar mellan varje behandling. Maxdos per applicering: 370g/ha. Godkänt t.o.m. 2033-06-01.			
Triam-P	5041		Trichoderma harzianum stam T-22 1E9 cfu/g
Applicering vid marktemperatur över +8 grader C. Applicering rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. Max 6 appliceringar/år, behandlingsintervall 28 dygn. Maxdos per applicering: 0,45 g/m2. Godkänt t.o.m. 2027-11-30.			

Mer information

Använd alltid Kemikalieinspektionens [Hjälpreda](#) vid bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom. Rekommenderad dos: se produktens etikett. Vid blandning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer. Preparat där godkännandet gått ut får, om inte Kemikalieinspektionen kommer med annan info, säljas sex månader efter registrerings utgång, samt användas och lagras 18 månader efter registrerings utgång. Därefter blir det anmärkning om den finns kvar i kemförrådet vid ev. myndighetskontroll. Mer om respektive produkt, se bekämpningsmedelsregistret på [kemi.se](#).